

# От болезней плодовых и декоративных культур



## Скор®

- Профилактическая защита и выраженное лечебное действие
- Быстрое проникновение в растение, дождеустойчивость
- Защита культур на 14-21 день в зависимости от степени инфицированности и погодных условий
- Гибкие сроки применения на плодовых культурах (розовый бутон, цветение, рост плодов)

### Регламенты применения

Культура	Вредный объект	Норма расхода препарата	Способ, время обработки, особенности применения
Яблоня, груша	Парша, мучнистая роса	2 мл/10 л воды	Опрыскивание в период вегетации до и после цветения с интервалом не более 14 дней. Расход рабочей жидкости: 2-5 л/дерево (в зависимости от возраста и сорта)
Абрикос, персик, слива	Курчавость листьев, кластероспориоз		
Вишня, черешня	Коккомикоз		
Цветочные растения	Мучнистая роса	2 мл/10 л воды	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезней, последующие – с интервалом 14 дней. Расход рабочей жидкости: 10 л/100 м <sup>2</sup>
	Серая гниль	4 мл/10 л воды	
Роза, декоративные кустарники	Пятнистости, в том числе черная	5 мл/10 л воды	
	Мучнистая роса	2 мл/10 л воды	

\* Полные рекомендации см. на упаковке