

As

MADE IN
GERMANY

Информация о товаре

Аминозол®

Органическое азотно-калийное удобрение, в жидкой форме

Organic NK fertiliser, liquid | p 1,23 | pH 5,0 - 7,0

Питательное вещество, массовая доля	г / л
9,4 % суммарная массовая доля азота (N)	116
58 % органических веществ (аминокислоты)	713
0,25 % суммарная массовая доля серы в том числе водорастворимой 0,23 %; 1,28 % суммарная массовая доля натрия в том числе водорастворимого 1,26 %; 66,3 % органических веществ органическое вещество с использованием побочных продуктов животного происхождения из категории 3 согласно Регламенту ЕС 1069/2009, гидролизированных белков	

Культура	Цель/Проблема	Рекомендации	Время применения
На всех культурах	Пушная дичь избегает обработанные культуры	2 л (Предварительно за 2-3 дня до нанесения растворить в 2 л воды (количество на 1 га))	При необходимости
На всех культурах	Повышение стрессоустойчивости, урожайности, восстановительного потенциала, содержания влаги, улучшение образования корней, поглощения питательных веществ, уменьшение стресса, вызванного облучением (антиоксидантное действие)	Фертигация	Обратитесь к региональному консультанту!
	Рост, формирование бутонов, формирование корневой системы	(Погрузите исходные материалы в 1% раствор или, альтернативно, воду с 1% раствором, 3-4 л / м ²)	Погрузите в момент высадки
На всех культурах	Увлажняющий и прилепающий адъювант для улучшения эффективности средств защиты растений	150 - 300 мл (на 100 л воды для опрыскивания)	Вместе со средствами защиты растений
На всех культурах	Повышение устойчивости к стрессу	1 - 2 раза 2 - 3 л/га (При нанесении с помощью ранцевого опрыскивателя — 0,3-0,5-процентный раствор)	В случае стресса
На всех культурах	Улучшение в эффективности и переносимости послевсходовых гербицидных обработок, урожайность, жизнестойкость	1 - 2 л/га	Вместе с послевсходовыми гербицидами, в экстремальных погодных условиях
На всех культурах	Повышение жизнестойкости (например, при заморозках в период цветения)	1 - 2 раза 2 л/га (максимальная эффективность достигается в сочетании с 1 л/га Lebosol®-Robustus)	При необходимости
На всех культурах	Пушная дичь избегает обработанные культуры	2 л (с 2 л воды, приготовить раствор заранее за 2-3 дня, количество для 1 га)	При необходимости

Дополнительную информацию можно получить по горячей линии +49 (0) 63 28-9 84 94-80 или на нашей домашней странице www.lebosol.ru



Lebosol® Dünger GmbH | Wiesengasse 28 | 67471 Elmstein — Германия | +49 (0) 63 28/9 84 94-0 | info@lebosol.de | www.lebosol.ru

Культура	Цель/Проблема	Рекомендации	Время применения
На всех культурах	Повышение стрессоустойчивости, урожайности, восстановительного потенциала, содержания влаги, улучшение образования корней, поглощения питательных веществ, уменьшение стресса, вызванного облучением (антиоксидантное действие)	1 - 4 раза 2 - 3 л/га (При нанесении с помощью ранцевого опрыскивателя — 0,3-0,5-процентный раствор)	В случае стресса
На всех культурах	Обработка семян питательными веществами для улучшения начального развития	0,1 - 0,4 л/ц семенного материала	Совместно с протравителем семян
На всех культурах	Повышение сопротивляемости цветков к холоду, урожайность	1 - 2 раза 2 л/га (максимальная эффективность достигается в сочетании с 1 л/га Lebosol®-Robustus SC + 5 л/га Lebosol®-калий 450)	При необходимости
	Рост, формирование бутонов, формирование корневой системы	(Погружение исходного материала в раствор из 1 % или в качестве альтернативы полив 1-процентным раствором)	При необходимости
Озимые/яровые зерновые культуры	Первоначальное развитие, урожайность, жизнестойкость	2 - 3 л/га	Весной с начала вегетации до конца кущения
Картофель	Быстрое восстановление растений после снятия пленки на раннем картофеле	2 - 3 л/га	Вместе с первой обработкой средствами защиты растений после снятия пленки
Картофель	Быстрое восстановление растений после снятия пленки на раннем картофеле	2 - 3 л/га	После снятия пленки
Садовая земляника (клубника)	Качество растений при производстве семян: сильные растения, формирования столонов	2 раза 2 - 3 л/га	За 14 и 7 дней до пересадки молодых растений
Садовая земляника (клубника)	Завязь плодов, качество	2 - 3 раза 5 - 7,5 л/га	С начала цветения с интервалами в 8 дней (в производственных помещениях)
Садовая земляника (клубника)	Завязь плодов, качество	2 - 3 раза 5 - 7,5 л/га	С начала цветения с интервалами в 8 дней (в производственных помещениях)
Садовая земляника (клубника)	формирование корневой системы, рост, первоначальное развитие	(Погрузить растение в раствор из 1 % или как альтернатива 5-10 л/га)	Через 7-10 дней после высадки
Садовая земляника (клубника)	Качество растений при производстве семян: сильные растения, формирования столонов	2 раза 2 - 3 л/га	За 14 и 7 дней до пересадки молодых растений
Садовая земляника (клубника)	формирование корневой системы, рост, первоначальное развитие	(Погрузить растения в 1-процентный раствор или, в качестве альтернативы, в воду с добавлением удобрения в количестве 5-10 л/га)	Через 7-10 дней после высадки
Семечковые фрукты	Улучшение завязи плодов, размер и цвет плода, минимизация ржавчины	2 раза 5 - 7,5 л/га	На яблонях: в фазу начала и полного формирования розового бутона; на грушах: до и после цветения
Семечковые фрукты	Улучшение в эффективности и переносимости обработок хлоридом кальция	1 - 2 л/га	Вместе с обработками хлоридом кальция
Семечковые фрукты	Улучшение завязи плодов, размер и цвет плода, минимизация ржавчины	2 раза 5 - 7,5 л/га	На яблонях: в фазу начала и полного формирования розового бутона; на грушах: до и после цветения
Косточковые фрукты	Для борьбы симптомов вируса шарки на листьях и плодах	3 раза 5 - 7,5 л/га (со средствами защиты растений)	С фазы цветения с интервалами в 30 дней
Косточковые фрукты	Улучшение завязи плодов, рост плодов, уменьшение опадения вишни	3 - 4 раза 5 - 7,5 л/га	С конца цветения с интервалами в 8 дней
Косточковые фрукты	Улучшение завязи плодов, рост плодов, уменьшение опадения вишни	3 раза 5 - 7,5 л/га	С конца цветения с интервалами в 8 дней
Косточковые фрукты	Для борьбы симптомов вируса шарки на листьях и плодах	3 раза 5 - 7,5 л/га (без средств защиты растений)	С фазы цветения с интервалами в 30 дней

Дополнительную информацию можно получить по горячей линии +49 (0) 63 28-9 84 94-80 или на нашей домашней странице www.lebosol.ru



Культура	Цель/Проблема	Рекомендации	Время применения
Кустарниковые ягоды	Завязь плодов, качество	2 - 3 раза 5 - 7,5 л/га	С начала цветения с интервалами в 8 дней (в производственных помещениях)
Кустарниковые ягоды	Завязь плодов, качество	2 - 3 раза 5 - 7,5 л/га	С начала цветения с интервалами в 8 дней (в производственных помещениях)
Столовый виноград	Равномерное развитие, завязь плодов, одновременное созревание	4 раза 3 - 5 л/га	После появления почек, в фазу полного цветения, после цветения, в фазу смыкания большинства ягод
Столовый виноград	Равномерное развитие, завязь плодов, одновременное созревание	4 раза 3 - 5 л/га	После появления почек, в фазу полного цветения, после цветения, в фазу смыкания большинства ягод
Цитрусовые плоды	Завязь плодов, качество	2 - 3 раза 5 - 7,5 л/га	С начала цветения с интервалами в 8 дней (в производственных помещениях)
Общее выращивание фруктов	Накопление резервных веществ, восстановление, зимостойкость, качество цветков	2 раза 2 - 3 л/га	После урожая
Виноград винных сортов	Равномерное развитие, завязь плодов, одновременное созревание	4 раза 3 - 5 л/га	После появления почек, в фазу полного цветения, после цветения, в фазу смыкания большинства ягод
Виноград винных сортов	Равномерное развитие, завязь плодов, одновременное созревание	4 раза 3 - 5 л/га	После появления почек, в фазу полного цветения, после цветения, в фазу смыкания большинства ягод
Общие овощи	формирование корневой системы, рост, первоначальное развитие	(Погрузить растения в 1-процентный раствор или, в качестве альтернативы, в воду с добавлением удобрения в количестве 5-10 л/га)	Через 7-10 дней после высадки
Общие овощи	Начало развития, рост, образование корней, предупреждение пятен, образующихся при разбрызгивании	5 - 10 л/га (Погружение исходного материала в раствор из 1 % или в качестве альтернативы полив 0,5-процентным раствором)	Через 7-10 дней после высадки
Хмель	Первоначальное развитие, урожайность, жизнестойкость, формирование корневой системы	1 - 3 раза 2 - 3 л/га	С момента достижения растением высоты 0.5 м и до начала цветения
Хмель	Первоначальное развитие, урожайность, жизнестойкость, формирование корневой системы	1 - 3 раза 2 - 3 л/га	С момента достижения высоты 0,5 м до сбора урожая
Табак	формирование корневой системы, рост, первоначальное развитие	(Погрузить растения в 1-процентный раствор или, в качестве альтернативы, в воду с добавлением удобрения в количестве 5-10 л/га)	Через 7-10 дней после высадки
Табак	формирование корневой системы, рост, первоначальное развитие	5 - 10 л/га (Погружение исходного материала в раствор из 1 % или в качестве альтернативы полив 0,5-процентным раствором)	Через 7-10 дней после высадки
Рождественская ель	Рост, формирование бутонов, формирование корневой системы	(Погрузите стартовые материалы в раствор 1% или в альтернативную воду с раствором 1%)	Погрузите в момент высадки
Рождественская ель	Рост, формирование бутонов, формирование корневой системы	(Погружение исходного материала в раствор из 1 % или в качестве альтернативы полив 1-процентным раствором)	При необходимости
Декоративные растения	Качество цветения и качество листьев, жизнестойкость, рост	Многочисленное нанесение 100 - 300 мл (на 100 л воды для опрыскивания, 2-3 л/га)	В течение вегетационного периода
Декоративные растения	Качество листьев и цветения, жизнестойкость, предупреждение пятен, образующихся при разбрызгивании	1 - 4 раза 100 - 300 мл (на 100 л воды для опрыскивания, 2-3 л/га)	После развития достаточного количества листьев

Дополнительную информацию можно получить по горячей линии +49 (0) 63 28-9 84 94-80 или на нашей домашней странице www.lebosol.ru



Культура	Цель/Проблема	Рекомендации	Время применения
Зелень	Улучшение первоначального развития, формирование корневой системы, жизнестойкость	2 - 5 раза 2 - 3 л/га	В течение вегетационного периода
Орехи	Завязь плодов, качество	2 - 3 раза 5 - 7,5 л/га	С начала цветения с интервалами в 8 дней (в производственных помещениях)
Хлопчатник	Завязь плодов, качество	2 - 3 раза 5 - 7,5 л/га	С начала цветения с интервалами в 8 дней (в производственных помещениях)